

## **Arteria ciática persistente, una causa infrecuente de bloqueo femoropoplíteo**

**Persistent sciatic artery, an  
uncommon cause of  
femoropopliteal occlusion**

10.20960/angiologia.00496

04/09/2024

# **Arteria ciática persistente, una causa infrecuente de bloqueo femoropoplíteo**

## ***Persistent sciatic artery, an uncommon cause of femoropopliteal occlusion***

Esteve Bramon Casademont, Jorge Moreno Molina

Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Correspondencia: Esteve Bramon Casademont. Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. C/ Sant Quintí, 89. 08041 Barcelona

e-mail: [ebramon@santpau.cat](mailto:ebramon@santpau.cat)

Recibido: 13/12/2023

Aceptado: 18/01/2023


*Conflictos de intereses: los autores declaran no tener conflictos de interés.*

*Inteligencia artificial: los autores declaran no haber usado inteligencia artificial (IA) ni ninguna herramienta que use IA para la redacción del artículo.*

*Artificial intelligence: the authors declare not to have used artificial intelligence (AI) or any AI-assisted technologies in the elaboration of the article.*

### **CASO CLÍNICO**

Se presenta el caso de un varón de 69 años sin factores de riesgo cardiovascular que consulta por claudicación intermitente de la extremidad inferior derecha. A la exploración presenta ausencia de pulso poplíteo y distales en dicha extremidad. Destaca una disminución de ambos pulsos femorales. Se certifica mediante el test de Strandness que la claudicación es por causa vascular y se solicita un angio TC que evidencia la presencia de arteria ciática persistente bilateral; la derecha está totalmente ocluida (Fig. 1). Dado que el paciente presenta una claudicación no invalidante, se opta por un manejo conservador. En los controles periódicos presenta una mejoría franca de su distancia de claudicación.



## DISCUSIÓN

La arteria ciática persistente (ACP) es una rara anomalía congénita debida a su no involución durante la etapa fetal, típicamente por falta de desarrollo de la arteria femoral superficial. Se estima una baja incidencia, de entre el 0,01 y el 0,05 %. Suele ser unilateral y permanecer asintomática.

La degeneración aneurismática es la complicación más conocida. Puede presentarse con compresión del nervio ciático o isquemia del miembro por trombosis del aneurisma. Hay que sospechar esta entidad delante de una masa glútea pulsátil o en paciente con el signo de Cowie, definido como la ausencia o la disminución del pulso femoral con el resto de pulsos normales.

El manejo terapéutico de esta anomalía debe individualizarse. Se sugieren controles periódicos de por vida a través de métodos no invasivos en los pacientes asintomáticos con el objetivo de disminuir el riesgo de complicaciones. No hay consenso sobre el tratamiento de la ACP sintomática. Están descritas en la literatura tanto estrategias quirúrgicas abiertas como endovasculares en pacientes con riesgo de pérdida de la extremidad.

Este caso expone la importancia de realizar un estudio vascular riguroso en los pacientes claudicantes, especialmente en aquellos sin perfil vasculopata o que presenten anomalías en la exploración.

## **BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA**

1. Van Hooft IM, Zeebregts CJ, Van Sterkenburg SMM, de Vries WR, Reijnen MMPJ. The Persistent Sciatic Artery. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2009;37(5):585-91. DOI: 10.1016/j.ejvs.2009.01.014

