



IMAGEN CLÍNICA DEL MES. SOLUCIÓN

Solución del caso 17. Aneurisma bilateral de vena yugular externa y trombosis bilateral secuencial



Solution to case 17. Bilateral aneurysm of external jugular vein and sequential bilateral thrombosis

R.P. Cortés*, R.S. Calvo, J.A. Torres Hernández y F.S. Lozano Sánchez

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España

Recibido el 20 de septiembre de 2016; aceptado el 10 de octubre de 2016

Disponible en Internet el 5 de enero de 2017

Comentarios

La flebectasia yugular o aneurisma venoso es la dilatación de la vena, causada por múltiples etiologías (tumores, síndrome de desfiladero torácico, traumatismos, idiopáticas, etc.). Es rara, existen pocos casos publicados, y menos de forma bilateral como el caso que presentamos¹⁻⁴. En orden decreciente son más frecuentes en la vena yugular interna, externa y anterior¹⁻³. Se manifiesta como una tumoración blanda, no dolorosa, que cambia de tamaño con la maniobra de Valsalva¹⁻³. En casos asintomáticos el tratamiento es conservador, aunque a veces la clínica o riesgo de complicaciones aconsejen la cirugía, consistente en la exéresis del aneurisma¹⁻³.

Nuestro caso se trató de forma conservadora ya que no presentaba síntomas. Curiosamente, el eco-Doppler, tras 6 meses evidenció la resolución de la trombosis en la yugular externa izquierda, y la aparición de signos de trombosis en la derecha, permaneciendo igualmente la paciente asintomática.

Respuesta correcta: c

Véase contenido relacionado en DOI:

<http://dx.doi.org/10.1016/j.angio.2016.10.008>

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: rubenpenacortes@hotmail.com
(R.P. Cortés).

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Bibliografía

1. Neto T, Balhau R, Coelho L, Pinto I, Correia-Sá I, Silva A. Thrombosed aneurysm of the external jugular vein: A rare cause of cervical mass. *J Craniofac Surg.* 2016;27:e36-7.
2. Verma RK, Kaushal D, Panda NK. External jugular vein aneurysm with thrombus presenting as painful neck mass: A case report. *Oman Med J.* 2013;28:278-80.
3. Escapa Garrachón JM, Alonso Castañeira I, Encina Gaspar B, Alonso Treceño JL. Flebectasia trombosada de la vena yugular externa derecha con dolor cervical. *Acta Otorrinolaringol Esp.* 2012;63:399-401.
4. Hindi Z, Fadhel E. Idiopathic bilateral external jugular vein thrombosis. *Am J Case Rep.* 2015;16:554-7.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.angio.2016.11.005>

0003-3170/© 2016 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de SEACV.